



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 8/2567

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งหลังของเดือนเมษายน ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก แต่จะมีฝนฟ้าคะนองในบางวัน ซึ่งจะช่วยให้คลายร้อนลงได้ เนื่องจาก ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วงๆ ประกอบกับยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ส่วนบริเวณภาคใต้ ช่วงแรกยังคงมีฝนน้อย จากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก และคลื่นลมในทะเลอันดามันจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น บางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เนื่องจากในระยะแรกยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้พัดปกคลุมภาคใต้ จากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้

คำเตือน

ระยะนี้ ยังคงมีพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร เช่น อาคารบ้านเรือนและเรือสวน ไร่นาได้ ขอให้เกษตรกรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร


สภาพอากาศร้อนและมีแสงแดดจัด เนื่องจากการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ที่ตกลงมาบนพื้นผิวของประเทศไทย เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดและระบายน้ำที่ผิวหนังได้ พร้อมทั้งดื่มน้ำมากๆ ส่วนในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง หรือเข้าไปใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เช่น ต้นไม้ใหญ่ ตลอดจนป้ายโฆษณาต่างๆ ทั้งนี้ควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่เพาะปลูก และหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน สำหรับปริมาณน้ำระเหยมีมาก ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย ซึ่งจะต้องให้น้ำแก่พืชให้เพียงพอทดแทนที่สูญเสียไปจากการคายระเหย เพื่อไม่ให้พืชผลชะงักการเจริญเติบโตและตายได้

สัตว์เลี้ยง สภาพอากาศที่ร้อนแล้ง ซึ่งมีผลทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดความเครียดได้ อาการสัตว์ป่วยที่สังเกตพบได้ในช่วงหน้าร้อนนี้คือ ซึม เบื่ออาหาร หากเป็น โค กระบือ มักจะไม่มีอาการอื่นร่วม เช่น ไข้สูงหรือท้องเสีย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ผิวหนังไม่มัน ไล่แมลง หากเป็นสุกร อาการที่พบได้คือ หายใจลำบาก มีไข้ต่ำ ซึมลง งาม ไอ ส่วนสัตว์ปีกอาการที่พบได้คือ คอตก หายใจเสียงดัง โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดหาน้ำดื่มและอาหารให้เพียงพอ ควรปรับลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน และจัดการโรงเรือนให้โปร่งอากาศระบายถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งไม่ให้ความชื้นภายในโรงเรือน โดยเฉพาะวัสดุรองพื้นหรือเกลบให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อให้สัตว์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นการป้องกันสัตว์เครียด อ่อนแอ และเจ็บป่วยได้ง่าย และหมั่นทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์ในการเลี้ยง นอกจากนี้ควรสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์เจ็บป่วยผิดปกติควรแยกออกเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด แล้วทำการรักษาในทันที

สัตว์น้ำ ฤดูร้อนนี้ทำให้ปริมาณน้ำ ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลง อาจไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สภาวะดังกล่าวทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้ การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ เนื่องจากในฤดูร้อนเกษตรกรต้องควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด ลดการให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่ายหรือบริโภคก่อนเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชัง ทั้งนี้ควรหมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากผิดปกติจะได้แก้ไขทันการณ์

ไม้ผล การดูแลไม้ผลในฤดูร้อนให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็น และกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออก เพื่อให้ทรงพุ่มไม้ผลโปร่งลดการคายน้ำ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง มีอัตราการระเหยของน้ำมาก ควรให้น้ำแก่พืชทดแทนน้ำที่สูญเสียไปให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต คือประมาณร้อยละ 60 ของน้ำระเหย โดยให้หมั่นสังเกตหากพบว่าไม้ผลเริ่มเหี่ยวเฉา ต้องรดน้ำทันที หรืออย่างน้อย 7-10 วันต่อครั้ง สำหรับโรคและศัตรูพืชให้เกษตรกรหมั่นสำรวจหากพบการระบาดของเพลี้ยและโรชนิดต่างๆ จะต้องรีบกำจัดก่อนที่โรคและศัตรูพืชจะระบาดเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจะทำให้ควบคุมได้ยาก

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน 2567



ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่	อุณหภูมิ °ซ.	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย