



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สภาวะอากาศ

ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน และจะเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยจะลดลงได้ในบางช่วง แต่ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝน โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ ๑ - ๒ เมตร และจะมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตรได้ในบางช่วง

คำเตือน

ในช่วงนี้ช่วงนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้เกษตรกรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการเกษตร

บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกพืช เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกติดต่อกันทำให้ดินมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังการแพร่ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

สัตว์เลี้ยง : เกษตรกรควรดูแลและซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณหลังคาโรงเรือนและแผงกั้นฝนสาด เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน และไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค และกระบือ รวมทั้งควรจัดเตรียมพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเอาไว้สำหรับอพยพสัตว์เลี้ยงหากเกิดน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์

สัตว์น้ำ : เกษตรกรควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสม ควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกเพื่อเป็นการเพิ่มการไหลเวียน และเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำป้องกันการเน่าค้ำของสัตว์น้ำ นอกจากนี้เกษตรกรควรเสริมขอบบ่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเสริมคันขอบบ่อให้สูงเพื่อไม่ให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก : ในพื้นที่มีฝนตกชุกดินมีความชื้นแฉะและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งเอื้อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เกษตรกรควรระวังโรครากเน่า โคนเน่า หากมีน้ำท่วมขังควรระบายน้ำออก และควรดูแลสวนหรือแปลงปลูกให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึงเพื่อลดความชื้นสะสม

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา


ออกประกาศวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.๐๒-๓๙๙๒๓๒๒

KS



4-7 ซม./วัน




32-34
24-26



2-4 มม./วัน



4-7 ซม./วัน




33-35
24-26



2-4 มม./วัน



4-7 ซม./วัน



32-34
24-26




2-4 มม./วัน



ประมาณ 2 เมตร



4-7 ซม./วัน



31-33
24-26




2-4 มม./



ประมาณ 2 เมตร



4-7 ซม./วัน



32-34
24-26



2-4 มม./วัน



4-7 ซม./วัน



32-34
24-26



2-4 มม./วัน



ประมาณ 2 เมตร

