




พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ


ระหว่าง วันที่ 2 – 8 กันยายน 2567

ข้อควร
ระวัง


ระยะนี้ ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากสภาพที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 4-8 ก.ย.




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้-ออก



ภาคใต้-ตก

พยากรณ์อากาศเกษตร เพื่อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ลักษณะอากาศ : ระยะนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

คำแนะนำ

ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคกาบใบเน่า ส่วนแมลงศัตรูข้าวโพดที่มักพบระบาด ได้แก่ หนอนกระทู้ข้าวโพด และเพลี้ยจักจั่น เป็นต้น การควบคุมควรเลือกปลูกสายพันธุ์ที่ต้านทานโรค ลดความชื้นในแปลงด้วยการปรับระยะห่างระหว่างแถวปลูก และปลูกพืชหมุนเวียน ส่วนการใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกัน ควรใช้เมื่อจำเป็น



ระวัง โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้



ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพด จะกัดกินใบ ทำให้ต้นทรุดโทรม



การควบคุม การใช้สารเคมีฉีดพ่น เมื่อจำเป็น



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 36/2567

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 8 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 3-5 ก.ย. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 8 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2-4 ก.ย. 67 ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 8 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. 67 ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 4-8 ก.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 3-5 ก.ย. 67 ส่วนในวันที่ 8 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 67 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4-8 ก.ย. 67 ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 8 ก.ย. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 2-3 และ 8 ก.ย. 67 ตั้งแต่จังหวัดระนอง ขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงา ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4-7 ก.ย. 67 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 2-7 ก.ย. ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดสัปดาห์ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องกันทำให้ในอากาศและดินมีความชื้นสูง โดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้สัตว์เสี่ยงอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย สำหรับคลื่นลมในช่วงวันที่ 4-8 ก.ย. บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามัน จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่ง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในระยะนี้มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและการแพร่ระบาดของแมลงสำหรับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่พบมาก ได้แก่ **โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew)** สาเหตุเนื่องเชื้อรา อาการที่พบบริเวณใบจะมีลักษณะสีขาวหรือเหลืองและมักพบราสีขาวอยู่ด้านใต้ใบ หากการระบาดรุนแรงอาจทำให้พืชแคระแกรนและตายได้ **โรคใบไหม้ (Southern Corn Leaf Blight)** สาเหตุเนื่องจากเชื้อรา อาการที่พบบริเวณใบมีจุดไหม้สีน้ำตาลและเหลือง พบระบาดมากขึ้นในสภาพอากาศชื้นและฝนตกบ่อย **โรคกาบใบเน่า (Sheath Blight)** สาเหตุเกิดจากเชื้อรา อาการที่พบเกิดแผลสีน้ำตาลที่กาบใบ ซึ่งสามารถลุกลามและทำให้ใบเหี่ยวแห้ง การควบคุมเกษตรกรควรใช้พันธุ์ต้านทานโรคได้ดี ปรับปรุงการระบายน้ำในแปลงให้สามารถระบายน้ำได้ดี ลดความชื้นภายในแปลงปลูกด้วยการปรับระยะห่างระหว่างแถวปลูก รวมทั้งการหมุนเวียนพืช หากจำเป็นควรใช้สารป้องกันเชื้อรา สำหรับแมลงศัตรูข้าวโพดที่มักพบการระบาดในที่ที่มีฝนตกชุก ได้แก่ **หนอนกระทู้ข้าวโพด (Fall Armyworm)** โดยหนอนกัดกินใบ ทำให้ใบข้าวโพดเป็นรูพรุน และจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในสภาพอากาศชื้นสูง การควบคุมใช้สารเคมี และการจัดการแปลงปลูกให้สะอาด **เพลี้ยจักจั่น (Leafhoppers)** จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและยอด ทำให้พืชเหี่ยวเฉา วิธีการควบคุมให้ใช้สารเคมี และการจัดการแปลงปลูกอย่างเหมาะสม สำหรับวิธีการจัดการทั่วไปในช่วงฤดูฝนเกษตรกรควรปรับปรุงระบบระบายน้ำในแปลงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและลดความชื้น การจัดการแปลงปลูกเกษตรกรควรรักษาความสะอาดของแปลงปลูก เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด ส่วนการใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกันเชื้อราและกำจัดแมลงเกษตรกรควรใช้เมื่อจำเป็น

ปริมาณฝนสะสม 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา 02-3669336

[PK]