



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568

ข้อควรระวัง

- ❖ บริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
- ❖ ภาคใต้ ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลต่อ : ไม้ผล

ลักษณะอากาศ : 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 68 บริเวณประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า ส่วนในช่วงวันที่ 1-6 เม.ย. 68 จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้มีฝนหนักถึงหนักมาก

คำแนะนำ : เกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไร เป็นต้น ซึ่งมักพบระบาดในช่วงที่มีความชื้นในอากาศต่ำ อากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนตกน้อย โดยศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช ทำให้พืชทรุดโทรม ผลผลิตด้อยคุณภาพ แล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราบางชนิด



ระวัง ศัตรูพืชจำพวกปากดูด
(เพลี้ย-ไร ต่างๆ)



ตัดแต่งกิ่ง
ส่วนที่เพลี้ยทำลายแล้วนำเผา



ฉีดพ่นด้วยสารเคมี
เพื่อควบคุมแพร่ระบาด





พยากรณ์อากาศเพื่อไม้ผล

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 13/2568

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. มีฝน/ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 2-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 1-4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย. ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 1 และ 5-6 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 2-4 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง หรืออยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง **ส่วนภาคใต้ 1-4 มี.ค. 68** ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้


สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อผลไม้

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด เกษตรกรควรดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยง โดยหลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งบริเวณที่มีแดดจัดเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำและการเป็นโรคลมแดด (Heatstroke) นอกจากนี้บางพื้นที่อาจมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 68 เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย โดยให้นำสัตว์เลี้ยงกลับเข้าโรงเรือน ไม่ควรปล่อยไว้กลางแจ้งในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะสัตว์เลี้ยงอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่าได้ ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรกรควรระวังอันตรายจากสภาวะดังกล่าว

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าว และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ประกอบกับความชื้นในอากาศต่ำ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูด (เพลี้ยและไร) เช่น เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงขนาดเล็กสีขาวชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผล แล้วยังเป็นแหล่งเพาะของโรคราดำ เพลี้ยอ่อน เป็นเพลี้ยที่มีขนาดเล็กสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีดำเข้ม ดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอด ใบอ่อน และดอก เพลี้ยไฟ จะมีลักษณะเรียวยาว มีปีกแคบ ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน และดอก ซึ่งการระบาดของเพลี้ยชนิดต่างๆ จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น คุณภาพของผลผลิตลดลง แล้วยังเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคพืชต่างๆ ด้วย สำหรับการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในไม้ผลสามารถทำได้โดยตัดแต่งกิ่งหรือส่วนที่เพลี้ยทำลายแล้วนำเผาทำลายนอกแปลงปลูก หรืออาจใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (*Beauveria*) หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติสามารถทำลายเพลี้ยได้ผสมกับน้ำตามอัตราส่วนแล้วฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น ส่วนศัตรูพืชจำพวกไรต่างๆ เป็นศัตรูพืชที่เป็นปัญหาที่สำคัญในการดูแลรักษาสวนไม้ผล โดยเฉพาะในไม้ผลประเภทส้ม ทุเรียน และมะม่วง มักพบการระบาดของไรแดงแอฟริกัน ชนิดนี้จะทำลายใบและผล ไรเหลืองส้ม ชนิดนี้ทำลายใบและผลส้มเช่นเดียวกับไรแดงแอฟริกัน ส่วนไรขาวพริก ชนิดนี้จะทำลายใบอ่อนและผลอ่อน สำหรับการป้องกันและการกำจัด เริ่มตั้งแต่ก่อนทำการปลูก เกษตรกร ควรทำความสะอาดโดยกำจัดเศษกิ่งไม้ใบไม้และวัชพืชในแปลง เพราะการทำลายเศษพืชช่วยลดโอกาสให้โรคและแมลงได้ หรือใช้สารเคมี การใช้สารเคมีมีความสำคัญในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ควรใช้สารที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของศัตรู นอกจากนี้การใช้สิ่งมีชีวิตช่วยควบคุมศัตรูพืช เช่น การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ หรือการใช้สาหร่าย สามารถช่วยลดการระบาดของศัตรูได้ รวมทั้งการคัดเลือกสารพันธุ์ที่ต้านทานโรค แต่ทั้งนี้เกษตรกรควรใส่ใจในการตรวจสอบต้นไม้ในทุกๆ ระยะเวลา และทำการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ล่วงหน้า

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2568



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]