



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อ มันสำปะหลัง

ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2568

ฉบับที่ 14/2568

! ข้อควรระวัง ระยะนี้ประเทศไทยจะมี **อากาศร้อน** กับมี **ฝนฟ้าคะนอง** เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ส่วนไทยตอนบน ในช่วงวันที่ **7 – 8 เม.ย. // 12 – 13 เม.ย.** จะมี **พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง** เกษตรกรควรระวังความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว



คำแนะนำสำหรับสภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อ มันสำปะหลัง

คำแนะนำโดยทั่วไป

- เพิ่มการให้น้ำแก่พืชอย่างเหมาะสม
- อากาศแห้ง ระวังอัคคีภัย และ ไฟป่า
- ควรคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นภายในดิน
- บางช่วงจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ควรระวัง/ป้องกันความเสียหาย
- ชาวเรือ/ชาวประมง ระวังการเดินเรือในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง



คำแนะนำสำหรับ มันสำปะหลัง

- ระวังป้องกันศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น โรคไรแดง
- ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนกระทู้
- ระวังป้องกันโรคใบด่างในสำปะหลัง
- คลุมดินโคนต้นไม้ผลด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
- สรรองน้ำไว้สำหรับการปลูกต้นอ่อนในช่วงแล้ง





พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อมันสำปะหลัง

ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 14/2568

สถานะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 9 - 11 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกและตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 8 - 11 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 39 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 9 - 11 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 - 41 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 9 - 11 เม.ย. อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 12 - 13 เม.ย. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันตก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 7 - 8 เม.ย. อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 13 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 8 เม.ย. และ 12 – 13 เม.ย. 68 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อการปลูกมันสำปะหลัง

สัปดาห์นี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพโดยดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ สำหรับสภาพอากาศที่แห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร ระยะนี้ปริมาณและการกระจายของฝนน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำ ที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนโดยดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกทั้งแนวตั้งและแนวดิ่ง หรือฉีดน้ำเป็นฝอยบริเวณโรงเรือนหรือฉีดน้ำบริเวณหลังคาโรงเรือน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สัตว์น้ำอยู่อย่างแออัดส่งผลให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 8 เม.ย. และ 12 – 13 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอาคารบ้านเรือนด้วย

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งส่วนมากจะทำการปลูก 2 ช่วง คือ ในช่วงปลายฤดูฝนกับการปลูกต้นฤดูฝน ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน ถ้าปลูกช่วงฤดูฝนควรดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมหากปลูกหลังจากเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องวัชพืชที่มีต้นทุนสูงที่สุดในการกำจัด อนึ่ง ในระยะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย เนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นเวลานานในบางพื้นที่ เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังควรระวังโรคไรแดง ลักษณะการทำลายของไรแดงมันสำปะหลังจะดูดกินน้ำเลี้ยงบนหลังใบของส่วนยอดและขยายปริมาณลงสู่ใบส่วนล่าง ทำให้ดำสลับ ใบเหลืองซีด ม้วนงอ และร่วง โดยช่วงเวลาระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน การป้องกันกำจัดใช้วิธีศัตรูธรรมชาติ คือ ตัวงูเต่าและตัวงูปีกเสือ และหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน แต่อย่างไรก็ตามการตกของฝนจากห่อหมกความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนในระยะนี้สามารถลดการระบาดของไรแดงได้บ้าง โดยขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงหากพบระบาดรุนแรงในระยะเป็นต้นอ่อนให้พ่นสารป้องกันกำจัดพ่นเฉพาะบริเวณที่มีไรแดงทำลาย เมื่อใบส่วนยอดของต้นอ่อนเริ่มแสดงอาการม้วนงอ รวมทั้งในระยะนี้ให้ระวังโรคแมลงหวี่ขาวซึ่งมีลักษณะการทำลายโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนใต้ใบพืชและถ่ายมูลหوانลงมาบนใบที่อยู่ด้านล่าง ทำให้เกิดเป็นราดำขึ้นตามใบที่อยู่ด้านล่าง ทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย ใบม้วนซีด และร่วง การป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวจะต้องหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งนาน เช่นเดียวกัน และควรเก็บส่วนของพืชที่ถูกทำลาย เผาทำลายนอกแปลงปลูก


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมิวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมิวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2568

กรมอุตุนิยมิวิทยา โทร.02-3669336

NT

ปริมาณฝนสะสม
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2568



THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT